

Patrick Moore, MD, FACS

Instrucciones Postoperatorias para Resección del Colon

Medicamentos para el Dolor

1. Usted recibirá una receta para medicamentos para el dolor para que lo consuma como sea necesario. Tome bastante agua para evitar constipación.
2. Cuando el dolor baje, cambie a Tylenol Extra Strength para el dolor que persista.
3. Si le da náusea o vómito, no asociado con los medicamentos para el dolor, mantenga una dieta de líquidos claros y llame a la oficina si la náusea o el vómito persisten.

Manejar

1. No maneje hasta que se lo recomiende el doctor.
2. No maneje bajo la influencia de los medicamentos para el dolor.

Vendaje(s)

1. Puede bañarse después de la cirugía; seque la herida suavemente

Actividades

1. Mantenga sus actividades muy livianas por las siguientes 4 semanas. No levante nada más de 10 libras(5 kilos).Puede caminar y subir escalones.

Dieta

1. Mantenga dieta de fibra baja hasta que regrese a la oficina para su cita postoperatoria con el doctor

LLAME AL DOCTOR SI EXPERIMENTA LO SIGUIENTE:

1. Si ve flujo inusual supurando de la herida.
2. Si le da fiebre de 101 con escalofríos.
3. Si le aumenta el dolor dramáticamente.
4. Si persiste la nausea o el vomito.

Llame al **(951) 477-5700** para hacer cita en la oficina.